

<p><u>Niereninsuffizienz</u> (Funktionseinschränkung der Niere)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - durch verschiedene Ursachen (z.B. Entzündungen, Nierenzysten, angeborene Veränderungen etc.) hervorgerufene vorübergehende oder andauernde Schädigung der Nierenzellen 	<ul style="list-style-type: none"> - zur Schonung der noch intakten Nierenzellen muß eine speziell zusammengestellte Nieren-Diät gefüttert werden - auf mehrere kleine Mahlzeiten verteilt füttern - Stress fernhalten! - Regelmäßige Kontrolle der Blutwerte! 	<ul style="list-style-type: none"> - Nieren-Diät: Sano Croq N - Leichte Flocke mit sehr wenig Fleisch
<p><u>Herzinsuffizienz</u> (Herzschwäche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - unzureichende Leistung des Herzens verschiedener Ausprägung, meist durch altersbedingte Veränderungen am Herzen, aber auch z.T. angeboren 	<ul style="list-style-type: none"> - Schweregrad und erforderliche Maßnahmen (Schonung, Medikamentierung) unbedingt vom Tierarzt abklären lassen - Die medikamentöse Therapie ist meist lebenslang erforderlich! - Leistung/Bewegung entsprechend anpassen - Stress und Aufregung vermeiden - Leicht verdauliches Futter auf mehrere kleine Mahlzeiten verteilt anbieten - Krokette(n) gegebenenfalls vor dem Füttern einweichen, alternativ Flockenvollnahrung verwenden - Bei hochgradigen Beschwerden auf einen niedrigen Natrium-Gehalt im Futter achten 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Besonders niedriger Natrium-Gehalt:</u> - Sano-Croq N - Senior-Croq - Natur-Croq Senior - Natur-Croq XXL - NaturCroq Lamm & Reis - NaturCroq - Leichte Flocke mit nicht zu viel salzlos gekochtem Fleisch (bei Bedarf ggf. SCN mit einem anderen Futter gemischt anbieten, falls der Hund schlecht frisst)

<p><u>Leberinsuffizienz</u> (Funktionseinschränkung der Leber)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - durch verschiedene Lebererkrankungen (meist Entzündungen) verursachte unzureichende Organfunktion aufgrund vorübergehender oder dauerhafter Schädigung der Leberzellen - oft sind gleichzeitig auch andere Organe wie Niere, Bauchspeicheldrüse, Magen und/oder Darm betroffen 	<ul style="list-style-type: none"> - Eiweiß- und Fettgehalt des Futters sollten niedrig sein - Mehrere kleine Mahlzeiten sollten über den Tag verteilt gegeben werden - Besonders leicht- und hochverdauliches Futter sollte bevorzugt werden - Kroketten vor dem Füttern einweichen - Bei sehr hochgradigen Beschwerden (Bauchwassersucht, Anfallsleiden) muß u.U. auf spezielle Veterinär-Diäten mit extrem niedrigen Eiweiß- und Natriumwerten zurückgegriffen werden 	<ul style="list-style-type: none"> - HAPPY DOG Leicht-Croq oder Senior-Croq (bei erhöhten Leberwerten <u>mit</u> Fettverdauungsstörungen) - HAPPY DOG Sano Croq N (bei stärker erhöhten Leberwerten <u>ohne</u> Vorliegen von Fettverdauungsstörungen) - bei Bedarf können beide Produkte zum Erreichen mittlerer Gehalte auch gemischt werden! - Leichte Flocke mit nicht zu viel Fleisch
--	---	---	---